



Was Eltern wissen wollen:



- 1 Gemäß den Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand Juli 2008, Quelle: Epidemiologisches Bulletin 30/2008 und Ergänzung, Robert Koch-Institut
- 2 Versäumte Impfungen sollten möglichst bald nachgeholt werden
- 3 Gleichbedeutend mit dem Beginn des folgenden Lebensmonats/-jahres
- 4 Mindestabstand zwischen den Impfungen 4 Wochen
- 5 Impfung entsprechend Herstellerangaben
- 6 Zweite VZV-Impfung bei Verwendung eines 4fach-Kombinationsimpfstoffs. Erforderlicher Abstand vorzugsweise 6 Wochen bis 3 Monate
- 7 Ungeimpfte ohne durchgemachte Windpocken-erkrankung
- 8 Zeitgleiche Gabe mit anderen Impfstoffen siehe Gebrauchsinformation
- 9 Grundimmunisierung für bisher nicht geimpfte Kinder und Jugendliche
- 10 Standardimpfung für Mädchen – Grundimmunisierung mit 3 Dosen für alle Mädchen im Alter von 12–17 Jahren

Alles Wissenswerte für Eltern über Kindergesundheit und Impfschutz.

- **Persönliche Beantwortung** der Elternfragen online
- **„Vergissmeinnicht“-Service** für Impftermine und U-Untersuchungen
- Tagesaktueller **Newsticker**
- **Krankheiten von A–Z**
- **Impfaufklärung**
- Ihr gutes **Recht**
- **Kids & Fun**
- **Individueller Impfkalender** Jetzt auch in türkischer Sprache
- **Neu:** News als Podcast-Abo

Impftermine für Ihr Kind

gemäß Impfkalender der STIKO^{1,2} für Säuglinge, Kinder und Jugendliche



Impfungen gegen	Vollendeter Lebensmonat (2,3)					Vollendetes Lebensjahr (2,3)	
	2	3	4	11-14	15-23	5-6	9-17
Grundimmunisierung* – Diphtherie – Tetanus – Keuchhusten – Hepatitis B – Kinderlähmung – Haemophilus influenzae Typ b (Hib)	1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung	4. Impfung		Auffrischimpfung – Tetanus – Diphtherie – Keuchhusten	Auffrischimpfung – Tetanus – Diphtherie – Keuchhusten – Kinderlähmung
Pneumokokken	1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung	4. Impfung			
Grundimmunisierung** – Masern – Mumps – Röteln – Varizellen				1. Impfung	2. Impfung (4,5,6)		Impfung (5,7) – Varizellen
Meningokokken (8)				Impfung ab dem vollendeten 12. Lebensmonat (3)			
Hepatitis B							Grundimmunisierung (9)
HPV (HPV-Typen: 16, 18)							Grundimmunisierung (10) (Mädchen 12–17 Jahre)

* mögl. mit 6fach-Kombinationsimpfstoff

** mögl. mit 4fach-Kombinationsimpfstoff